

กสอ

พ.ศ. ๒๕๖๖

๐๘ ๓๐๖

ททสจ.สงขลา

๕๔

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖

๑๐.๒๑ พ.



องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รับที่.....๒๒๖๖

วันที่.....๑.๓.๒๕๖๖

เวลา.....๑๐.๔๔ น.

ศาลากลางจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท รม ๒๑๑๕๐

กองสาธารณสุข

รับที่.....๓๕๘

วันที่.....๑๔ ก.พ. ๖๖

เวลา.....๐๙.๓๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ที่ รย ๐๐๓๓ / ๑๖๕๓

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด ๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด ๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับ มีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ และยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้วัคซีนโควิด ๑๙ เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประชาชนไทย และจากการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

๑. กำหนดให้วัคซีนโควิด ๑๙ ในผู้ที่มีอายุ ๖ เดือน - ๕ ปี กำหนดให้วัคซีน Pfizer ฝาสีแดง จำนวน ๓ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ - ๘ สัปดาห์ และระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกันอย่างน้อย ๘ สัปดาห์ ทั้งนี้ ยังไม่มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในขณะนี้

๒. กำหนดการให้วัคซีนโควิด ๑๙ ในผู้ที่มีอายุ ๕ - ๑๑ ปี

๒.๑ วัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ - ๘ สัปดาห์

๒.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๒.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๓. กำหนดการให้วัคซีนโควิด ๑๙ ในผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี

๓.๑ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ สัปดาห์

๓.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๓.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๔. กำหนดการ...

๔. กำหนดการให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป

๔.๑ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง

๔.๑.๑ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ สัปดาห์

๔.๑.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๔.๑.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง หรือวัคซีน Astra Zeneca เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๔.๒ วัคซีน Astra Zeneca

๔.๒.๑ วัคซีน Astra Zeneca จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๘ สัปดาห์

๔.๒.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง หรือวัคซีน Astra Zeneca เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๔.๒.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป

๔.๒.๔ กรณีผู้ประสงค์รับเฉพาะวัคซีน Astra Zeneca ชนิดเดียว ให้เว้นระยะห่างระหว่างวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ ๒ และวัคซีน Astra Zeneca เข็มกระตุ้น เป็นเวลา ๖ เดือน - ๑ ปี (เร็วที่สุด ๓ เดือน กรณีมีการระบาด)

๔.๒.๕ กรณีผู้ที่เคยรับวัคซีน Astra Zeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ ๑ แล้ว การจะได้รับวัคซีน Astra Zeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ ๒ ควรเว้นระยะห่าง ๖ เดือน - ๑ ปี (เร็วที่สุด ๔ เดือน กรณีมีการระบาด)

๔.๓ วัคซีนสูตรไขว้ Astra Zeneca - Pfizer ฝาสีม่วง

๔.๓.๑ วัคซีน Astra Zeneca เป็นเข็มที่ ๑ และ Pfizer ฝาสีม่วง เป็นเข็มที่ ๒ ระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๑ และ ๒ ห่างกัน ๔ สัปดาห์

๔.๓.๒ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง หรือวัคซีน Astra Zeneca เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และ ๓ ห่างกัน ๓ เดือน

๔.๓.๓ วัคซีน Pfizer ฝาสีม่วง หรือวัคซีน Astra Zeneca เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๓ และ ๔ ห่างกัน ๔ เดือนขึ้นไป


๕. ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโควิด 19 มาก่อน ในกรณีที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือเคยฉีดมาก่อนเพียง ๑ เข็ม ควรให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น หลังจากเป็นโรคประมาณ ๓ เดือน กรณีที่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากเป็นโรค อย่างน้อย ๖ เดือน

๖. ในกรณีอื่นๆ สามารถพิจารณาให้วัคซีนตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่นๆ ภายใต้อดุลพินิจของแพทย์

ในการนี้ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงขอแจ้งคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังกล่าว อย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัด เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ให้ทราบต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุนทร เจริญภูมิการกิจ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โทร. ๐ ๓๘๙๖ ๗๔๑๕ , ๐๖ ๒๒๔๙ ๑๕๘๑



คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านมติการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565

และมติการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3 (กระตุ้นครั้งที่ 1)	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 (กระตุ้นครั้งที่ 2) ขึ้นไป
ผู้ที่มีอายุ 6 เดือน – 4 ปี	Primary series - Pfizer ฝาสีแดง 3 เข็ม; เข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 4-8 สัปดาห์, เข็มที่ 2 และ 3 ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์					ยังไม่มีคำแนะนำ	ยังไม่มีคำแนะนำ
ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	4-8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม	3 เดือน	Pfizer ฝาสีส้ม	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีส้ม
ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส/ครึ่งโดส	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca
	AstraZeneca (ทางเลือก)	8 สัปดาห์	AstraZeneca (ทางเลือก)	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca ²	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง
	AstraZeneca (ทางเลือก)	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง (ทางเลือก)	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca ³

1. ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโควิด 19 มาก่อน ในกรณีที่ไม่มีเคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือเคยฉีดมาก่อนเพียง 1 เข็ม ควรให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น หลังจากเป็นโรคประมาณ 3 เดือน, กรณีที่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากเป็นโรคอย่างน้อย 6 เดือน
2. กรณีผู้ประสงค์รับเฉพาะวัคซีน AstraZeneca ชนิดเดียว ให้เว้นระยะห่างระหว่าง AstraZeneca เข็มที่ 2 และ AstraZeneca เข็มกระตุ้น เป็นเวลา 6 เดือน - 1 ปี (เร็วที่สุด 3 เดือน กรณีมีการระบาด)
3. กรณีผู้ที่เคยรับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 1 แล้ว การจะได้รับ AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 ควรเว้นระยะห่าง 6 เดือน - 1 ปี (เร็วที่สุด 4 เดือน กรณีมีการระบาด)
4. ในกรณีอื่น ๆ สามารถพิจารณาให้วัคซีนตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่น ๆ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์
5. คำแนะนำเป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการศึกษาวิจัยที่มีเพิ่มเติมในอนาคต